



HAL
open science

In vivo imaging of ram spermatozoa in the ewe genital tract using fibered confocal microscopy

X. Druart, Juliette Cognie, G. Baril, F. Clement, J.-L. Dacheux, J.-L. Gatti

► **To cite this version:**

X. Druart, Juliette Cognie, G. Baril, F. Clement, J.-L. Dacheux, et al.. In vivo imaging of ram spermatozoa in the ewe genital tract using fibered confocal microscopy. *Gynécologie Obstétrique & Fertilité*, 2011, 39 (11), pp.633-635. 10.1016/j.gyobfe.2011.09.007 . hal-00776193

HAL Id: hal-00776193

<https://inria.hal.science/hal-00776193>

Submitted on 29 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

QUESTIONS À L'AUTEUR

	Revue : GYOBFE Numéro d'article : 2190	Merci de retourner vos réponses par e-mail ou par fax à : E-mail : corrections.esme@elsevier.thomsondigital.com Fax : +33 (0) 1 71 16 51 88
---	---	--

Cher auteur,

Vous trouverez ci-dessous les éventuelles questions et/ou remarques qui se sont présentées pendant la préparation de votre article. Elles sont également signalées dans l'épreuve par une lettre « Q » suivie d'un numéro. Merci de vérifier soigneusement vos épreuves et de nous retourner vos corrections soit en annotant le PDF ci-joint, soit en les listant séparément.

Pour toute correction ou modification dans les figures, merci de consulter la page <http://www.elsevier.com/artworkinstructions>.

Articles de numéros spéciaux : merci d'ajouter (dans la liste et dans le corps du texte) la mention « dans ce numéro » pour toute référence à d'autres articles publiés dans ce numéro spécial.

Références non appelées : Références présentes dans la liste des références mais pas dans le corps de l'article – merci d'appeler chaque référence dans le texte ou de les supprimer de la liste.	
Références manquantes : Les références ci-dessous se trouvaient dans le texte mais ne sont pas présentes dans la liste des références. Merci de compléter la liste ou de les supprimer du texte.	
Emplacement dans l'article	Question / Remarque Merci d'insérer votre réponse ou votre correction à la ligne correspondante dans l'épreuve
Q1 Q2	Merci de vérifier que les prénoms et les noms ont été correctement identifiés. Veuillez compléter l'adresse de correspondance en nous transmettant les éléments manquants, soit: [le numéro et le nom de la voie, la ville]

Utilisation des fichiers électroniques

Si nous n'avons pas pu exploiter le fichier de votre article et/ou de vos figures, nous avons utilisé la méthode suivante :

Scan de (ou de parties de) votre article

Ressaisie de (ou de parties de) votre article

Scan des figures

Merci de votre collaboration.



Disponible en ligne sur
 ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
 EM|consulte
www.em-consulte.com



2 Quarante-deuxième Journée thématique de la Société française d'étude de la fertilité (Paris, 17 mars 2011)

3 Visualisation in vivo des spermatozoïdes de bélier dans le tractus génital
4 de brebis par microscopie confocale fibrée

5 *In vivo imaging of ram spermatozoa in the ewe genital tract using fibered confocal microscopy*

6 Q1 X. Druart^{a,*}, J. Cognie^a, G. Baril^a, F. Clement^b, J.-L. Dacheux^a, J.-L. Gatti^a

7 Q2^a UMR 6175 Inra, CNRS-université de Tours-Haras Nationaux, physiologie de la reproduction et des comportements, 37380 Nouzilly, France
8 ^b INRIA Paris-Rocquencourt, Domaine de Voluceau, Rocquencourt BP 105, 78153 Le Chesnay cedex, France

INFO ARTICLE

Historique de l'article :

Reçu le 27 juillet 2011
Accepté le 19 août 2011
Disponible sur Internet le xxx

Mots clés :

Spermatozoïde
Imagerie in vivo
Tractus génital femelle
Transit
Fertilité

Keywords:

Sperm
In vivo imaging
Female genital tract
Transit
Fertility

RÉSUMÉ

Chez les mammifères domestiques, le transit des spermatozoïdes dans le tractus femelle, ainsi que leur survie durant la période pré-ovulatoire sont reconnus comme des éléments importants pour la réussite de l'insémination. Cependant, l'étude de ce transit est limitée par l'absence de méthode d'imagerie des spermatozoïdes in vivo. La visualisation des spermatozoïdes de bélier dans le tractus femelle de brebis a été possible grâce au couplage de la microscopie confocale fibrée et de l'utilisation de marqueurs fluorescents adaptés à l'observation in vivo, c'est-à-dire stables in vivo et marquant l'intégralité de la surface du spermatozoïde. Nos résultats montrent le rôle prédominant de la jonction uterotubaire, qui relie l'utérus à l'oviducte, dans la sélection des spermatozoïdes au cours du transit.

© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

ABSTRACT

Sperm transit in the female tract is one of the key factors in the success of fertilization after artificial insemination in sheep species. However, its study is limited by the absence of in vivo imaging methods. The imaging of ram sperm in the female genital tract was made possible using the confocal fibered microscopy and fluorescent stains adapted to spermatozoa. Our results show the active role of the uterotubal junction in the selection of sperm during their transit.

© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.

9
10 **1. Introduction**

11 Chez les mammifères domestiques, la réussite de la fécondation
12 après accouplement ou insémination artificielle (IA) dépend de
13 nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, le transit des spermatozoïdes
14 dans le tractus femelle, ainsi que leur survie durant la période pré-
15 ovulatoire, sont reconnus comme des éléments importants. Cela
16 est particulièrement vrai lorsque la semence est soumise à des
17 processus de conservation, comme la congélation ou la conser-
18 vation liquide pour des durées de un à plusieurs jours. Par exemple,
19 chez les ovins, la fertilité de la semence congelée est équivalente à
20 la fertilité après saillie naturelle lorsque la semence est déposée
21 directement dans l'utérus, mais fortement réduite après un dépôt
22 dans le vagin, en amont du col de l'utérus [1]. Cela suggère que le

23 passage du col de l'utérus par les spermatozoïdes est altéré par le
24 procédé de conservation. Afin d'étudier l'impact de la conservation
25 sur l'aptitude des spermatozoïdes à franchir le col de l'utérus et
26 transiter dans le tractus femelle, la mise au point d'une méthode de
27 quantification des spermatozoïdes in vivo était nécessaire. En effet,
28 jusqu'à présent, les études quantitatives ont été réalisées ex vivo
29 par histologie, microscopie électronique ou comptage des sper-
30 matozoïdes après lavage du tractus femelle obtenu après abattage
31 des animaux [2]. Chez certaines espèces comme la souris et le
32 hamster, les spermatozoïdes peuvent être directement observés ex
33 vivo dans l'oviducte par transparence [3]. Les rares études réalisées
34 in vivo chez les animaux domestiques sont basées sur la
35 scintigraphie du tractus femelle après insémination avec des
36 spermatozoïdes marqués avec un traceur radioactif, et permettent
37 de visualiser les régions du tractus contenant des spermatozoïdes
38 [4].

L'objectif de cette étude est donc de concevoir une méthode de
visualisation in vivo des spermatozoïdes individuels dans le tractus

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : xavier.druart@tours.inra.fr (X. Druart).

41 génital femelle basée sur l'utilisation de la microscopie confocale
42 fibrée.

43 2. Patients et méthodes

44 La semence de trois béliers de race Lacaune est collectée à l'aide
45 d'un vagin artificiel et diluée à une concentration finale de
46 1×10^6 spermatozoïdes par mL, dans un milieu à base de lait
47 écrémé reconstitué (11,1 g de poudre de lait pour 100 mL d'eau
48 déminéralisée) et supplémenté en antibiotiques (gentamycine à
49 $50 \mu\text{g/mL}$). Quinze minutes avant l'IA, la semence est incubée à 37°C
50 avec un fluorochrome, l'octadécyl rhodamine B (R18) qui colore la
51 membrane plasmique de tous les spermatozoïdes en orange.
52 L'œstrus est induit chez 12 brebis de race Île de France par un
53 traitement progestatif de 13 jours (éponges vaginales de 30 mg
54 d'acétate de fluorogestone) suivi d'une injection de 500 unités de
55 Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) au moment du retrait
56 de l'éponge. L'insémination, avec la semence diluée et colorée, est
57 réalisée par voie intra-utérine, 55 heures après le retrait de l'éponge.
58 Une quantité de 75×10^6 spermatozoïdes est déposée dans la base
59 de chaque corne utérine, soit au total 150×10^6 spermatozoïdes par
60 brebis. La visualisation des spermatozoïdes *in vivo* est réalisée à
61 l'aide d'un microscope confocal fibré, le Cellvizio[®] (Mauna Kea
62 Technologies, Paris). Ce système comprend une source d'excitation
63 laser (488 nm), une fibre optique et un logiciel d'acquisition et de
64 traitement des images vidéo, en temps réel. Parmi la gamme de
65 fibres optiques disponibles et présentant des diamètres et des
66 résolutions optiques différentes, une fibre de 1,5 mm a été retenue
67 car son diamètre est compatible avec les dimensions de la lumière de
68 l'utérus et de l'oviducte, et sa résolution latérale de $3,3 \mu\text{m}$ permet
69 de visualiser correctement les spermatozoïdes. Les images sont
70 acquises à une fréquence fixe de 12 images par seconde. Une autre
71 fibre de 4 mm, présentant une résolution supérieure ($1,8 \mu\text{m}$),
72 a également été ponctuellement utilisée pour observer les
73 spermatozoïdes individuellement et visualiser les domaines

morphologiques (tête, pièce intermédiaire, flagelle). La quantifica-
tion du transport des spermatozoïdes dans les voies génitales
femelles est réalisée cinq heures après insémination. Les brebis sont
placées sous anesthésie générale et le tractus génital (cornes
utérines, oviductes et ovaires) est extériorisé par laparotomie. Afin
d'insérer la fibre optique dans la lumière de l'utérus et de l'oviducte,
un trou de 2 mm est réalisé à l'aide d'un bistouri électrique à
différents niveaux : dans le corps utérin près du cervix, dans les
régions basses et hautes de la corne utérine et, au niveau de la
jonction utéro-tubaire. À partir de ces points d'entrée, l'acquisition
des images est réalisée aux niveaux suivants : bas, milieu et haut de
corne, jonction utéro-tubaire et oviducte. La procédure d'acquisition
est standardisée et des séquences vidéo de deux minutes sont
enregistrées à chaque niveau du tractus. À partir de chaque
séquence, dix champs sont retenus aléatoirement et le nombre de
spermatozoïdes par champ est compté. Un nombre moyen de
spermatozoïdes par champ est ensuite calculé pour chacune des
régions analysées. La distribution des spermatozoïdes au sein des
différentes régions du tractus femelle est évaluée par analyse de
variance (procédure GLM du logiciel SAS).

3. Résultats

Par laparotomie sous anesthésie générale, nous pouvons
extérioriser le tractus femelle et accéder aisément aux différentes
régions des cornes utérines (bas, milieu, haut), à la jonction
utéro-tubaire entre l'utérus et l'oviducte (JUT), et à l'oviducte
(Fig. 1A). Le site de dépôt de la semence, réalisé cinq heures
auparavant par injection intra-utérine, peut être retrouvé au niveau
du bas de la corne utérine. Une fibre optique est ensuite insérée dans
la corne utérine et permet de visualiser la lumière et la paroi interne
du tractus. La paroi de l'endomètre utérin présente une autofluores-
cence importante, tandis que la lumière apparaît sombre. Cette
autofluorescence peut être utilisée pour visualiser la paroi de
l'endomètre à l'échelle cellulaire (Fig. 1B). Les spermatozoïdes sont




Fig. 1. Visualisation des spermatozoïdes dans le tractus génital femelle. A. Les cornes utérines de la brebis sont extériorisées sous anesthésie générale quatre heures après insémination et la fibre optique du système de microscopie confocale fibrée est insérée dans la lumière de l'organe. B. Autofluorescence de l'épithélium de l'endomètre. C. Une population de spermatozoïdes en mouvement est visualisée à l'aide de la fibre optique de résolution latérale égale à $3,3 \mu\text{m}$. D. Les différents domaines morphologiques (tête, pièce intermédiaire, flagelle) d'un spermatozoïde mobile peuvent être visualisés *in vivo* à l'aide de la fibre optique de résolution latérale égale à $1,8 \mu\text{m}$.

107 retrouvés à différents niveaux du tractus en concentration
108 croissante entre le bas de la corne et la jonction uterotubaire
109 ($9,4 \pm 1,8$, $16,2 \pm 2,2$, $21,2 \pm 3,0$ et $21,9 \pm 2,9$ spermatozoïdes/champ
110 pour, respectivement, le bas, le milieu, le haut de corne et la jonction
111 uterotubaire), puis à une concentration beaucoup plus faible dans
112 l'oviducte ($3,4 \pm 0,8$ spermatozoïdes/champ, $p < 0,05$). La microscopie
113 confocale fibrée permet d'acquérir des séquences vidéo, donc
114 d'observer la dynamique du transit des spermatozoïdes. Celui-ci est
115 la résultante de la mobilité individuelle des spermatozoïdes et des
116 contractions utérines ascendantes. Nous pouvons observer à la fois le
117 mouvement d'ensemble dû aux contractions utérines (Fig. 1C), ainsi
118 que la mobilité individuelle des spermatozoïdes (Fig. 1D).

119 4. Discussion

120 La visualisation des spermatozoïdes dans le tractus femelle a été
121 possible grâce au couplage de la microscopie confocale fibrée et de
122 l'utilisation de marqueurs fluorescents adaptés à l'observation in
123 vivo. Nous avons expérimenté des marqueurs fluorescents couram-
124 ment utilisés pour l'analyse des fonctions biologiques des sperma-
125 tozoïdes, mais beaucoup se sont révélés inutilisables pour la
126 visualisation in vivo, principalement à cause de leur intensité de
127 fluorescence insuffisante ou de leur instabilité in vivo. Le marqueur
128 R18 est un acide gras à longue chaîne (C18) couplé à une molécule de
129 rhodamine. Le R18 permet de colorer les spermatozoïdes sur
130 l'ensemble de leur surface en émettant une fluorescence dont
131 l'intensité est stable pendant plusieurs heures in vitro et in vivo. Des
132 essais préliminaires in vitro n'ont pas montré d'effet du R18 sur la
133 viabilité et la mobilité des spermatozoïdes de bélier. La nécessité d'un
134 signal fluorescent d'intensité élevée est également liée à l'auto-
135 fluorescence de l'épithélium utérin [5]. Il est à noter que l'oviducte,
136 contrairement à l'utérus, ne présente pas d'autofluorescence. La
137 microscopie confocale fibrée permet donc de visualiser les
138 spermatozoïdes fluorescents avec une résolution suffisante, pour
139 effectuer leur dénombrement et quantifier leur transit dans le tractus
140 femelle. La stabilité du marquage in vivo nous a permis de retrouver

les spermatozoïdes jusqu'à 24 heures au moins après l'insémination. 141
Nos résultats montrent un gradient croissant de la concentration en 142
spermatozoïdes, entre le bas de la corne utérine et la jonction 143
uterotubaire, quatre heures après l'insémination. Ce gradient peut 144
s'expliquer par le rôle de barrière sélective que joue la jonction 145
uterotubaire, en limitant fortement le passage des spermatozoïdes 146
vers l'oviducte [6]. Le transit des spermatozoïdes est le résultat des 147
contractions utérines et de la mobilité des spermatozoïdes. Il est 148
donc important de pouvoir mesurer la mobilité des spermatozoïdes 149
in vivo. La fréquence d'acquisition des images (12 images/s) permet 150
de visualiser la mobilité et de caractériser les trajectoires des 151
spermatozoïdes, selon des paramètres objectifs comme la vitesse 152
linéaire. Toutefois, des développements seront nécessaires pour 153
adapter les méthodes actuelles de mesure de la mobilité à ces 154
nouvelles images vidéo obtenues in vivo. À l'avenir, nous étendrons 155
l'utilisation de la microscopie confocale fibrée pour étudier le transit 156
des spermatozoïdes in vivo dans d'autres espèces modèles. 157

Déclaration d'intérêts 158

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en 159
relation avec cet article. 160

Références 161

- 162 [1] Salamon S, Maxwell WMC. Storage of ram semen. *Anim Reprod Sci* 2000;62: 163
77-111. 164
- 165 [2] Hunter RH. The Fallopian tubes in domestic mammals: how vital is their 165
physiological activity? *Reprod Nutr Dev* 2005;45:281-90. 166
- 167 [3] Suarez SS. Sperm transport and motility in the mouse oviduct: observations in 167
situ. *Biol Reprod* 1987;36:203-10. 168
- 169 [4] Bruckner G, Kampfer I, Rummer HJ, Menger H, Schneider G. Use of 131I labeling 169
for studying the distribution and migration of spermatozoa in the genital tract 170
of female sheep following artificial insemination. 1. Gamma camera studies of 171
the course of migration. *Arch Exp Veterinarmed* 1982;36:297-305. 172
- 173 [5] Drezek RA, Rebecca Richards-Kortum MAB, Feld MS, Pitris C, Ferenczy A, Faupel 173
ML, et al. Optical imaging of the cervix. *Cancer* 2003;98:2015-27. 174
- 175 [6] Suarez SS. Regulation of sperm storage and movement in the mammalian 175
oviduct. *Int J Dev Biol* 2008;52(5-6):455-62. 176